

Правила подготовки к диагностическим исследованиям

Забор крови производится в утренние часы с 7:30 до 10:00 на голодный желудок в кабинете 3.24 по направлению с указанием времени.

Перед проведением общей анестезии в амбулаторных условиях необходимо:

- иметь при себе следующие результаты лабораторно-инструментальных обследований (**давностью не более 10 дней**): ОАК (количество эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов), биохимический анализ крови (общий белок, глюкоза, билирубин), свертывающая система крови (общий фибриноген, АЧТВ, ПТИ), группа крови и резус фактор, ЭКГ;
- в возрасте более 40 лет или наличии хронического заболевания иметь заключение терапевта или узкого специалиста по профилю заболевания для оценки фазы заболевания и степени его компенсации (**давностью не более 30 дней**);
- накануне прекратить **прием пищи не позднее, чем за 6 часов, жидкости за 2 часа** до начала проведения анестезии;
- исключить молочные продукты и газированные напитки за сутки до вмешательства;
- через 2 часа после анестезии иметь взрослого человека для сопровождения домой;
- исключить вождение автомобиля в течении 24 часов.

При осмотре врача анестезиолога-реаниматолога предоставить следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество, возраст, рост, вес;
- группа крови и резус фактор;
- наличие заболеваний внутренних органов (гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, сахарный диабет и т.д.);
- инфекционные заболевания в прошлом/настоящем (туберкулез, ВИЧ, гепатит В С, сифилис и т.д.);
- наличие неврологических заболеваний (эпилепсия, мигрени и т.д.);
- было стационарное лечение;
- были анестезии и/или операции;
- были проблемы и/или осложнения связанные с анестезией;
- вредные привычки в т.ч. в прошлом (курение, алкоголь, наркотики);
- чрезмерное употребление кофе (более 3 чашек в сутки);
- были аллергические реакции (пищевые, бытовые, на лекарственные средства и т.д.);
- были травмы (сотрясение/ушиб головного мозга, переломы конечностей и т.д.);
- длительный прием лекарственных средств за последние 3 месяца;
- проводили ли Вам переливание донорской крови и/или ее компонентов;
- появляется ли чрезмерная одышка и/или боли за грудиной при физической нагрузке (по сравнению с др. людьми).

Противопоказанием к проведению общей анестезии в амбулаторных условиях являются:

- нестабильность соматического состояния, хронические заболевания в стадии обострения;

- острые воспалительные заболевания, не связанные с предстоящим вмешательством;
- патологическое ожирение;
- наличие наркотической зависимости и лекарственной непереносимости.